平成26年度病害虫発生予報第12号（3月予報）

＜今月のコラム＞　・3月に発生が予想される病害虫について
・2週先までの気温の予測情報　～異常天候早期警戒情報とは～

＜お知らせ＞　イネヨトウの性フェロモントラップへの誘殺数の推移について以下URLに掲載しています。
http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/byogaichubojo/documents/ineyo-phero.html

今月のトピックス

すすかび病　（トマト）

学名：*Pseudocercospora fuligena*



葉裏面の灰褐色の病斑



葉表面の淡黄緑色の病斑



鞭状の分生子



植物体上の分生子柄と分生子



発病株

生態と被害

本病は、葉に発生する病害で、初めは葉の裏面に不明瞭な淡黄緑色の病斑が現れ、やがて灰褐色粉状のかびを生じる。病斑は次第に円形または葉脈に囲まれた不整形に拡大し、灰褐色から黒褐色に変わる。葉の表面には、やや遅れて不明瞭な淡黄緑色の病斑及びかびを生じるが、裏面より少ない。本菌は、病斑上に形成された鞭状または円筒形の分生子が、作業時に飛散することで伝染する。また、被害残さで生存し次作での発生源となる。多湿条件や、密植、過繁茂、換気不十分で発病しやすいため、肥培管理を適正に行う。被害葉や被害残さは施設外に持ち出し処分する。

http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/byogaichubojo/index.html

平成27年2月27日
沖縄県病害虫防除技術センター