

中部保健所管内 感染症発生動向調査情報(月報)

2月

2025/2/1 ~ 2025/2/28

1. 患者報告数

| 疾病名 | 総数 | | 男 | | 女 | |
|------------|----|-----|----|-----|----|-----|
| | 中部 | 沖縄県 | 中部 | 沖縄県 | 中部 | 沖縄県 |
| 性器クラミジア | 9 | 27 | 0 | 1 | 9 | 26 |
| 性器ヘルペスウイルス | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 尖圭コンジローム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 淋菌 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |

2. 定点あたり報告数

| 疾病名 | 中部 | 沖縄県 | 全国 |
|------------|------|------|------|
| 性器クラミジア | 2.25 | 2.25 | 2.17 |
| 性器ヘルペスウイルス | 0.5 | 0.33 | 0.86 |
| 尖圭コンジローム | 0 | 0.08 | 0.47 |
| 淋菌 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |

※中部保健所管内 STD定点医療機関内訳

・泌尿器科・・・2医療機関

・産婦人科・・・2医療機関

計:4医療機関



※「**定点あたり報告数**」とは・・・1医療機関あたりの平均患者報告数



※**年齢別報告数や過去5年間の報告数の推移等は、「沖縄県感染症情報センター ホームページ」に掲載しています。**

詳しくは**こちら(沖縄県感染症情報センター)**をご覧ください。

3. 性感染症の主な症状について

| 疾患名 | 主な症状 |
|----------|--|
| 性器クラミジア | (男性) 排尿痛、尿道不快感、かゆみなどの症状がみられる。 (女性) 自覚症状に乏しいことが多い。子宮頸管炎、不妊などにつながることもある。 |
| 性器ヘルペス | 外陰部の不快感、かゆみ等の症状の後、発熱、全身倦怠感、リンパ節の腫れ、強い痛み等を伴って、潰瘍や水疱が出現する。女性では排尿困難や歩行困難のため、入院加療を余儀なくされることもある。一度感染すると、ウイルスが潜伏し、再発することが多い。 |
| 尖圭コンジローム | 性器・肛門周辺にとがったイボのようなものができ、おりものの増加やかゆみ、痛みを伴うことがある。 |
| 淋菌 | (男性) 急性尿道炎として発症し、膿などの分泌物や排尿時の痛みを伴う。 (女性) 子宮頸管炎として発症するが、自覚症状のない場合が多い。不妊につながることもある。 |

※**気になる症状がある場合は、医療機関(男性は泌尿器科・女性は産婦人科)へご相談ください。**