

ヤブガラシ類に対する防除効果の高い除草剤（ヤブガラシ類は多年生雑草に該当する）

農薬の種類	商品名	適用作物	適用場所	適用雑草	使用方法	使用時期	10アール当たり使用量		本剤の使用回数	総使用回数	備考
							薬量 (mL/g)	希釈水量(L)			
グリホサート・トカリウム塩液剤	ラウンドアップ・マックスロード	さとうきび	-	1年生雑草	雑草 茎葉 散布	耕起前又は植付前まで (雑草生育期)	200~500	【通常散布】 50~100 【少量散布】 25~50	4回以内	グリホサートを含む農薬の使用回数:6回以内	ヤブガラシ類の根を防除するために使用する。
				多年生雑草		収穫60日前まで (雑草生育期:畦間処理) (但し、仮差長1.5m以上)	500~1000		2回以内		
				1年生及び多年生雑草			500~1000				
				1年生雑草			200~500				
				多年生雑草			500~1,000				
2,4-PA液剤	2,4-D「石原」アミン塩	さとうきび	-	畑地1年生広葉雑草及び畑地多年生広葉雑草	雑草生育期 以降、雑草生育期 (草丈30cm以下) (但し、収穫90日前まで)	植付後又は株出管理後30日	300~500	100~150	2回以内	2,4-PAを含む農薬の使用回数:2回以内	各作型で2回以内しか使用できない。
ジクワット・パラコート液剤	ブリグロックスL、マイゼット			1年生雑草		雑草生育期 (但し、収穫3日前まで)	600~1,000	100~150	3回以内	ジクワットを含む農薬の使用回数:3回以内、パラコートを含む農薬の使用回数:3回以内	接触性の除草剤であるため、ヤブガラシ類の根は防除できない。また、ヤブガラシ類は多年生雑草であるため、畦間処理での登録は取れない。
				1年生雑草		畦間処理:雑草生育期 (但し、収穫3日前まで)	600~1,000	100~150			
				多年生雑草		雑草生育期 (但し、収穫3日前まで)	1000~2,000	100~150			

平成27年3月現在